

# ÚVOD DO FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZY

PŘÍKLADY PRO POROZUMĚNÍ LÁTCE – ZS 2015/2016

## PŘÍKLADY KE KAPITOLE I

K ODDÍLU I.1 – ZÁKLADNÍ POJMY, NORMY, NORMOVANÉ PROSTORY

**Příklad 1.** Nechť  $X$  je reálný vektorový prostor a  $\|\cdot\| : X \rightarrow [0, \infty)$  funkce splňující

- (i)  $\|x\| = 0$  právě když  $x = \mathbf{o}$ .
- (ii)  $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$  pro  $\lambda > 0$ .
- (iii)  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ .

Ukažte, že  $\|\cdot\|$  je norma, právě když pro každé  $x \in X$  je  $\|-x\| = \|x\|$ .

**Příklad 2.** Nechť  $X$  je komplexní vektorový prostor a  $\|\cdot\| : X \rightarrow [0, \infty)$  funkce splňující

- (i)  $\|x\| = 0$  právě když  $x = \mathbf{o}$ .
- (ii)  $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$  pro  $\lambda > 0$ .
- (iii)  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ .

- (1) Ukažte, že  $\|\cdot\|$  je norma, právě když pro každé  $x \in X$  a každou komplexní jednotku  $\alpha$  platí  $\|\alpha x\| \leq \|x\|$ .
- (2) Ukažte na protipříkladu, že  $\|\cdot\|$  nemusí být norma, pokud splňuje  $\|ix\| = \|x\|$  pro každé  $x \in X$ .

**Příklad 3.** Nechť  $X$  je normovaný lineární prostor a  $A \subset X$  je konvexní množina.

- (1) Nechť  $x \in \text{int } A$  a  $y \in A$ . Ukažte, že úsečka  $[x, y)$  patří do  $\text{int } A$ .
- (2) Ukažte, že  $\text{int } A$  je konvexní množina.
- (3) Ukažte, že  $\overline{A}$  je konvexní množina.

**Příklad 4.** Nechť  $X$  je normovaný lineární prostor a  $Y \subset X$  je jeho vektorový podprostor.

- (1) Ukažte, že  $\overline{Y}$  je také vektorový podprostor  $X$ .
- (2) Nechť  $Y$  má vnitřní bod. Ukažte, že  $Y = X$ .

**Příklad 5.** Nechť  $X$  je normovaný lineární prostor a  $A \subset X$  je jeho podmnožina. Označme

- $\text{co } A$  konvexní obal  $A$ , tj. nejmenší konvexní množinu obsahující  $A$ , neboli průnik všech konvexních podmnožin  $X$  obsahujících  $A$ ;
- $\overline{\text{co } A}$  uzavřený konvexní obal  $A$ , tj. nejmenší uzavřenou konvexní množinu obsahující  $A$ , neboli průnik všech uzavřených konvexních podmnožin  $X$  obsahujících  $A$ ;
- $\text{span } A$  lineární obal  $A$ , tj. nejmenší podprostor obsahující  $A$ , neboli průnik všech vektorových podprostorů  $X$  obsahujících  $A$ ;
- $\overline{\text{span } A}$  uzavřený lineární obal  $A$ , tj. nejmenší uzavřený podprostor obsahující  $A$ , neboli průnik všech uzavřených vektorových podprostorů  $X$  obsahujících  $A$ .

Ukažte, že

$$\overline{\text{co } A} = \overline{\text{co } \overline{A}} \quad \text{a} \quad \overline{\text{span } A} = \overline{\text{span } \overline{A}}.$$

Návod: Použijte tvrzení z předchozích dvou příkladů.

**Příklad 6.** Nechť  $c$  je prostor všech posloupností reálných (nebo komplexních čísel), které mají vlastní limitu. Ukažte, že  $c$  je uzavřený podprostor prostoru  $\ell^\infty$ , a tedy je to Banachův prostor (s normou  $\|\cdot\|_\infty$ ).

**Příklad 7.** Nechť  $\Gamma$  je nespočetná množina. Označme

$$\ell_c^\infty(\Gamma) = \{f \in \ell^\infty(\Gamma); \{\gamma \in \Gamma; f(\gamma) \neq 0\} \text{ je nejvýše spočetná}\}.$$

- (1) Ukažte, že  $\ell_c^\infty(\Gamma)$  je uzavřený podprostor  $\ell^\infty(\Gamma)$ .
- (2) Ukažte, že  $c_0(\Gamma) \subset \ell_c^\infty(\Gamma)$ .

**Příklad 8.** Nechť  $\mathcal{B}_b([0, 1])$  značí vektorový prostor všech omezených borelovských funkcí na  $[0, 1]$  a  $\mathcal{L}_b([0, 1])$  značí vektorový prostor všech omezených lebesgueovských měřitelných funkcí na  $[0, 1]$ . Ukažte, že oba tyto prostory jsou neseparabilní uzavřené podprostory  $\ell^\infty([0, 1])$ .

**Návod:** Použijte známý fakt, že bodová limita posloupnosti měřitelných funkcí je měřitelná. Pro důkaz neseparability uvažte charakteristické funkce jednobodových množin.

**Příklad 9.** Nechť  $UL((0, 1))$  značí vektorový prostor všech funkcí na  $(0, 1)$ , která mají v každém bodě intervalu  $[0, 1]$  vlastní limitu zprava a v každém bodě intervalu  $(0, 1]$  mají vlastní limitu zleva.

- (1) Ukažte, že každá funkce z  $UL((0, 1))$  je omezená na  $(0, 1)$ .
- (2) Ukažte, že  $UL((0, 1))$  je uzavřený podprostor  $\ell^\infty((0, 1))$ .
- (3) Nechť  $DA = \{f \in UL((0, 1)); f \text{ je zprava spojitá na } (0, 1)\}$ . Ukažte, že  $DA$  je uzavřený podprostor  $UL((0, 1))$ .
- (4) Ukažte, že prostor  $DA$  je neseparabilní.

**Návod:** (1) Použijte kompaktnost  $[0, 1]$ . (2,3) Použijte Moore-Osgoodovu větu. (4) Uvažte charakteristické funkce vhodných intervalů.

**Příklad 10.** Nechť

$$X = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{F}; \exists g \in \mathcal{C}([0, 1]; \mathbb{F}) \exists h \in c_0([0, 1]; \mathbb{F}) : f = g + h\}.$$

- (1) Ukažte, že vyjádření  $f = g + h$  použité v definici je jednoznačné.
- (2) Ukažte, že  $X$  je uzavřený podprostor  $\ell^\infty([0, 1])$ .

**Návod:** (1) Ukažte, že jediná funkce z  $c_0([0, 1])$ , která je spojitá na  $[0, 1]$ , je konstantní nulová funkce. (2) Ukažte, že ve vyjádření z bodu (1) je  $\|g\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ , a tento fakt využijte k důkazu uzavřenosti  $X$ .

**Příklad 11.** Nechť  $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$  značí prostor všech spojitých funkcí na  $\mathbb{R}$ , které mají v  $+\infty$  i v  $-\infty$  limitu nula. Ukažte, že  $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$  je uzavřený podprostor  $\mathcal{C}_b(\mathbb{R})$ .

**Příklad 12.** Pro posloupnost čísel  $(x_n)$  definujme její variaci vzorcem

$$\text{var}((x_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} |x_{n+1} - x_n|.$$

Označme symbolem  $bv$  množinu všech posloupností, jejichž variace je konečná.

- (1) Ukažte, že  $bv$  je vektorový podprostor  $\ell^\infty$ .
- (2) Ukažte, že každá posloupnost s konečnou variací má vlastní limitu, tj.  $bv \subset c$ .
- (3) Najděte posloupnost v  $c \setminus bv$ .
- (4) Je  $bv$  uzavřený v  $c$ ?
- (5) Je  $bv$  hustý v  $c$ ?

(6) Pro  $(x_n) \in bv$  položme

$$\|(x_n)\|_{bv} = |x_1| + \text{var}((x_n)).$$

Ukažte, že tento předpis definuje normu na  $bv$ , v níž je  $bv$  Banachův prostor.

- (7) Ukažte, že  $\ell^1 \subset bv$  a že  $bv$  obsahuje konstantní posloupnosti.  
Je  $bv = \text{span}(\ell^1 \cup \{(1)_{n=1}^\infty\})$ ?
- (8) Je  $\ell^1$  uzavřený podprostor  $bv$  (v normě  $\|\cdot\|_{bv}$ )?
- (9) Jsou na  $\ell^1$  normy  $\|\cdot\|_1$  a  $\|\cdot\|_{bv}$  ekvivalentní?

**Návod:** (2) Použijte Bolzano-Cauchyovu podmínu. (4,5) Využijte fakt, že posloupnost od jistého člena konstantní patří do  $bv$ . (6) Využijte Větičku I.5 z přednášky. (7,8) Uvažte monotonní posloupnosti. (9) Ukažte, že pokud by tyto dvě normy byly ekvivalentní, pak  $(\ell^1, \|\cdot\|_{bv})$  by byl úplný prostor.

**Příklad 13.** Nechť  $n \in \mathbb{N}$ . Označme

$$\mathcal{C}^n([0, 1], \mathbb{F}) = \{f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{F}; f^{(n)} \text{ je spojitá na } (0, 1) \text{ a lze spojitě rozšířit na } [0, 1]\}.$$

- (1) Ukažte, že pro každé  $k \in \{0, \dots, n\}$  je  $f^{(k)}$  spojitá na  $(0, 1)$  a lze spojitě rozšířit na  $[0, 1]$ .
- (2) Ukažte, že vzorec

$$\|f\|_{\mathcal{C}^n} = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty + \cdots + \|f^{(n)}\|_\infty, \quad f \in \mathcal{C}^n([0, 1], \mathbb{F})$$

definuje normu, v níž je prostor  $\mathcal{C}^n([0, 1], \mathbb{F})$  úplný.

- (3) Definujme na  $\mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{F})$  normu předpisem

$$\|f\| = \|f\|_\infty + \|f''\|_\infty, \quad f \in \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{F}).$$

Ukažte, že to je norma ekvivalentní  $\|\cdot\|_{\mathcal{C}^2}$ .

- (4) Je norma na  $\mathcal{C}^n([0, 1], \mathbb{F})$  definovaná vzorcem  $\|f\| = \|f\|_\infty + \|f^{(n)}\|_\infty$  ekvivalentní  $\|\cdot\|_{\mathcal{C}^n}$ ?

**Návod:** (1) Použijte matematickou indukci, Lagrangeovu větu o střední hodnotě a Bolzano-Cauchyovu podmínu. (2) Použijte větu o záměně limity a derivace a matematickou indukci. (3) Vyjádřete  $f'$  pomocí  $f''$  a  $f'(0)$  a  $f$  pomocí  $f'$  a  $f(0)$ . Ukažte, že  $\|f_n\| \rightarrow 0$  implikuje  $\|f'_n\|_\infty \rightarrow 0$ . (4) Postupujte podobně jako v (3).

**Příklad 14.** Nechť  $BV([0, 1], \mathbb{F})$  značí množinu všech funkcí  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{F}$ , které mají konečnou variaci. Připomeňme, že variace funkce  $f$  na  $[0, 1]$  je definována vzorcem

$$V(f) = \sup \left\{ \sum_{j=1}^n |f(x_j) - f(x_{j-1})| ; n \in \mathbb{N}, 0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1 \right\}.$$

- (1) Ukažte, že každá  $f \in BV([0, 1], \mathbb{F})$  je omezená na  $[0, 1]$  a že  $BV([0, 1], \mathbb{F})$  je vektorový podprostor  $\ell^\infty([0, 1], \mathbb{F})$ .
- (2) Ukažte, že předpis

$$\|f\|_{BV} = \|f\|_\infty + V(f), \quad f \in BV([0, 1], \mathbb{F}),$$

definuje normu na  $BV([0, 1], \mathbb{F})$ , v níž je  $BV([0, 1], \mathbb{F})$  Banachův prostor.

- (3) Ukažte, že předpis

$$\|f\| = |f(0)| + V(f), \quad f \in BV([0, 1], \mathbb{F}),$$

definuje normu na  $BV([0, 1], \mathbb{F})$  ekvivalentní s  $\|\cdot\|_{BV}$ .

**Návod:** (2) Použijte Větičku I.5 z přednášky.

**Příklad 15.** Nechť  $AC([0, 1], \mathbb{F})$  značí množinu všech funkcí  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{F}$  absolutně spojitých na  $[0, 1]$ . Připomeňme, že pro každou  $f \in AC([0, 1], \mathbb{F})$  existuje derivace  $f'(x)$  pro skoro všechna  $x \in [0, 1]$  a navíc  $f' \in L^1([0, 1])$ .

- (1) Ukažte, že každá  $f \in AC([0, 1], \mathbb{F})$  má konečnou variaci na  $[0, 1]$  a že  $AC([0, 1], \mathbb{F})$  je vektorový podprostor  $BV([0, 1], \mathbb{F})$ .
- (2) Ukažte, že předpis

$$\|f\|_{AC} = \|f\|_\infty + \|f'\|_{L^1}, \quad f \in AC([0, 1], \mathbb{F}),$$

definuje normu na  $AC([0, 1], \mathbb{F})$ , v níž je  $AC([0, 1], \mathbb{F})$  Banachův prostor.

- (3) Ukažte, že předpis

$$\|f\| = |f(0)| + \|f'\|_{L^1}, \quad f \in AC([0, 1], \mathbb{F}),$$

definuje normu na  $AC([0, 1], \mathbb{F})$  ekvivalentní s  $\|\cdot\|_{AC}$ .

- (4) Ukažte, že pro  $f \in AC([0, 1], \mathbb{F})$  je  $\|f\|_{AC} = \|f\|_{BV}$  a z toho odvod'te, že  $AC([0, 1], \mathbb{F})$  je uzavřený podprostor  $BV([0, 1], \mathbb{F})$ .

**Návod:** (2) Použijte úplnost prostoru  $L^1$ , Newton-Leibnizovu formuli pro absolutně spojité funkce a záměnu limity a integrálu. (4) Je třeba ukázat, že  $V(f) = \int_0^1 |f'|$ . Pro důkaz nerovnosti  $\leq$  použijte definici variace a Newton-Leibnizovu formuli pro absolutně spojité funkce. Pro důkaz nerovnosti  $\geq$  postupujte takto: Nechť  $F(t) = V(f; 0, t)$  je variace  $f$  na  $[0, t]$ . Pak  $F$  je neklesající,  $|f(s) - f(t)| \leq F(s) - F(t)$  pro  $0 \leq t \leq s \leq 1$ . Tedy  $|f'| \leq F'$  skoro všude na  $[0, 1]$ . Odtud odvod'te, že  $\int_0^1 |f'| \leq F(1) - F(0) = V(f)$ .

**Příklad 16.** Nechť  $(M, d)$  je omezený metrický prostor. Označmě symbolem  $\text{Lip}((M, d); \mathbb{F})$  vektorový prostor všech lipschitzovských funkcí  $f : M \rightarrow \mathbb{F}$ . Pro  $f \in \text{Lip}((M, d); \mathbb{F})$  označme a  $\text{lip}(f)$  nejmenší lipschitzovskou konstantu  $f$ , tj.

$$\text{lip}(f) = \sup \left\{ \frac{|f(x) - f(y)|}{d(x, y)} ; x, y \in M, x \neq y \right\}.$$

- (1) Ukažte, že každá  $f \in \text{Lip}((M, d); \mathbb{F})$  je omezená na  $M$ .
- (2) Ukažte, že vzorec

$$\|f\|_L = \|f\|_\infty + \text{lip}(f), \quad f \in \text{Lip}((M, d); \mathbb{F}),$$

definuje normu na  $\text{Lip}((M, d); \mathbb{F})$  a  $\text{Lip}((M, d); \mathbb{F})$  je s touto normou Banachův prostor.

- (3) Zvolme pevné  $x_0 \in M$ . Ukažte, že vzorec

$$\|f\| = |f(x_0)| + \text{lip}(f), \quad f \in \text{Lip}((M, d); \mathbb{F}),$$

definuje normu ekvivalentní s  $\|\cdot\|_L$ .

- (4) Uvažme  $M = [0, 1]$  s euklidovskou metrikou. Ukažte, že pro  $f \in C^1([0, 1]; \mathbb{F})$  platí  $f \in \text{Lip}([0, 1]; \mathbb{F})$  a  $\|f\|_L = \|f\|_{C^1}$ . Ukažte, že  $C^1([0, 1]; \mathbb{F})$  je uzavřený podprostor  $\text{Lip}([0, 1]; \mathbb{F})$ .

**Návod:** (2) Použijte Větičku I.5 z přednášky. (4) Použijte Newton-Leibnizovu formuli.

**Příklad 17.** Nechť  $(M, d)$  je metrický prostor (ne nutně omezený). Označmě symbolem  $\text{Lip}((M, d); \mathbb{F})$  vektorový prostor všech lipschitzovských funkcí  $f : M \rightarrow \mathbb{F}$  a pro  $f \in \text{Lip}((M, d); \mathbb{F})$  označme  $\text{lip}(f)$  nejmenší lipschitzovskou konstantu  $f$  (viz Příklad 16). Zvolme pevné  $x_0 \in M$ .

- (1) Ukažte, že prvky  $\text{Lip}((M, d); \mathbb{F})$  nemusí být omezené na  $M$ .

(2) Ukažte, že vzorec

$$\|f\| = |f(x_0)| + \text{lip}(f), \quad f \in \text{Lip}((M, d); \mathbb{F}),$$

definuje normu na  $\text{Lip}((M, d); \mathbb{F})$  a  $\text{Lip}((M, d); \mathbb{F})$  je s touto normou Banachův prostor.

(3) Zvolme  $x_1 \in M \setminus \{x_0\}$  a definujme normu na  $\text{Lip}((M, d); \mathbb{F})$  stejným způsobem, jen bod  $x_0$  v definici nahradíme bodem  $x_1$ . Je tato norma ekvivalentní normě z předchozího bodu?

**Příklad 18.** Nechť  $\mu$  je nezáporná míra a  $p \in [1, \infty]$ .

- (1) Ukažte, že jednoduché funkce v  $L^p(\mu)$  tvoří hustý podprostor  $L^p(\mu)$ .
- (2) Nechť  $\mu$  je regulární borelovská míra na nějakém metrickém prostoru  $M$ . Ukažte, že lineární kombinace charakteristických funkcí otevřených množin konečné míry tvoří hustý podprostor  $L^p(\mu)$  pro  $p \in [1, \infty)$ .
- (3) Nechť  $\mu$  je navíc  $\sigma$ -konečná a  $M$  separabilní. Ukažte, že prostor  $L^p(\mu)$  pro  $p \in [1, \infty)$  je separabilní.

**Návod:** (3) ukažte, že existuje spočetná báze otevřených množin  $M$  tvořená otevřenými množinami konečné míry. Ukažte, že charakteristickou funkcí otevřené množiny konečné míry lze approximovat charakteristickými funkcemi konečných sjednocení prvků báze a následně použijte výsledek (2).

**Příklad 19.** Nechť  $(X_n)$  je posloupnost normovaných lineárních prostorů a nechť  $\prod_{n=1}^{\infty} X_n$  je jejich kartézský součin uvažovaný jako vektorový prostor s obvyklými operacemi.

- (1) Ukažte, že

$$(\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} X_n)_{\ell^\infty} = \{(x_n) \in \prod_{n=1}^{\infty} X_n; \sup_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\|_{X_n} < \infty\}$$

je normovaný lineární prostor, pokud normu definujeme jako  $\|(x_n)\|_{\ell^\infty} = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\|_{X_n}$ . Ukažte, že tento prostor je úplný, právě když každý z prostorů  $X_n$  je úplný.

- (2) Ukažte, že

$$(\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} X_n)_{c_0} = \{(x_n) \in \prod_{n=1}^{\infty} X_n; \lim_n \|x_n\|_{X_n} = 0\}$$

je uzavřený podprostor  $(\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} X_n)_{\ell^\infty}$

**Příklad 20.** Nechť  $(X_n)$  je posloupnost normovaných lineárních prostorů a  $p \in [1, \infty)$ .

Položme

$$(\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} X_n)_{\ell^p} = \{(x_n) \in \prod_{n=1}^{\infty} X_n; \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|_{X_n}^p < \infty\}.$$

Ukažte, že to je normovaný lineární prostor, pokud normu definujeme jako  $\|(x_n)\|_p = (\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|_{X_n}^p)^{1/p}$ . Ukažte, že tento prostor je úplný, právě když všechny prostory  $X_n$  jsou úplné.

**Návod:** Pro důkaz úplnosti použijte Větičku I.5 z přednášky.

## K ODDÍLU I.2 – SPOJITÁ LINEÁRNÍ ZOBRAZENÍ, IZOMETRICKÉ A IZOMORFNÍ PROSTORY

**Příklad 21.**

- (1) Ukažte, že prostory  $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_1)$  a  $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$  jsou izometrické a najděte nějakou lineární izometrii mezi nimi.

- (2) Ukažte, že prostory  $(\mathbb{R}^3, \|\cdot\|_1)$  a  $(\mathbb{R}^3, \|\cdot\|_\infty)$  nejsou izometrické.  
(3) Jsou prostory  $(\mathbb{C}^2, \|\cdot\|_1)$  a  $(\mathbb{C}^2, \|\cdot\|_\infty)$  izometrické?

**Návod:** (2) Použijte pojem extremálního bodu: Bod z jednotkové koule je extremální, pokud není středem žádné úsečky, která leží celá v jednotkové kouli. Ukažte, že izometrie na zachovává extremální body. Popište a spočítejte extremální body jednotkových koulí obou prostorů. (3) Popište extremální body jednotkových koulí obou prostorů a použijte fakt, že kružnice není homeomorfni kartézskému součinu dvou kružnic.

**Příklad 22.** Nechť  $(a, b) \subset \mathbb{R}$  je otevřený interval (omezený nebo neomezený). Ukažte, že pro každé  $p \in [1, \infty]$  je prostor  $L^p((a, b))$  izometrický prostoru  $L^p((0, 1))$ .

**Návod:** Nejprve dokážte pro omezený interval  $(a, b)$  (s využitím affiní bijekce mezi  $(a, b)$  a  $(0, 1)$ ). Pro interval  $(0, \infty)$  postupujte například takto: S využitím předchozího případu zvolte izometrii  $T_n$  prostoru  $L^p((n-1, n))$  na prostor  $L^p((\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}))$  pro  $n \in \mathbb{N}$  a „slepte“ tyto izometrie. Pro ostatní neomezené intervaly postupujte podobně.

**Příklad 23.** Ukažte, že prostor  $L^p((0, 1))$  obsahuje podprostor izometrický prostoru  $\ell^p$ .

**Návod:** Uvažujte funkce konstantní na každém z intervalů  $(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n})$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

**Příklad 24.** Ukažte, že prostory  $c_0$  a  $c$  (viz Příklad 6) jsou izomorfní a najděte nějaký izomorfismus mezi nimi. Jsou izometrické?

**Návod:** Pro zkoumání izometričnosti využijte extremální body.

**Příklad 25.**

- (1) Ukažte, že prostor  $\mathcal{C}([0, 1])$  obsahuje podprostor izometrický prostoru  $c_0$ .  
(2) Obsahuje  $\mathcal{C}([0, 1])$  podprostor izometrický prostoru  $c$  (viz Příklad 6)?

**Návod:** (1) Sestrojte spojité funkce  $f_n : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ , které jsou nulové mimo  $[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}]$  a nabývají hodnoty 1 ve středu tohoto intervalu a uvažte jejich uzavřený lineární obal. (2) Přidejte k funkcím z bodu (1) ještě konstantní funkce.

**Příklad 26.** Nechť  $T : L^1([0, 1]) \rightarrow AC([0, 1])$  je definováno vzorcem  $Tf(t) = \int_0^t f$ . Ukažte, že  $T$  je izomorfismus do. Je  $T$  izometrie?

**Návod:** Využijte Příklad 15.

**Příklad 27.** Nechť  $X$  je prostor z Příkladu 10. Pro  $f \in X$  a uvedený rozklad  $f = g + h$  označme  $Pf = g$  a  $Qf = h$ . Uvažujme  $P$  a  $Q$  jako zobrazení  $X$  do  $X$ . Ukažte, že  $P$  a  $Q$  jsou spojité projekce, spočtěte jejich normy, jádra a obory hodnot.

**Příklad 28.** Nechť  $\mathcal{M}_{ac}([0, 1])$  značí podprostor  $\mathcal{M}([0, 1])$  tvořený mírami, které jsou absolutně spojité vzhledem k Lebesgueově mísře.

- (1) Ukažte, že  $\mathcal{M}_{ac}([0, 1])$  je izometrický prostoru  $L^1([0, 1])$  a popište nějakou izometrii mezi těmito prostory.  
(2) Ukažte, že  $\mathcal{M}_{ac}([0, 1])$  je uzavřený podprostor  $\mathcal{M}([0, 1])$ .

**Návod:** (1) Použijte Radon-Nikodýmovu větu.

**Příklad 29.** Pro  $\mu \in \mathcal{M}([0, 1])$  definujme funkce  $T_1(\mu)$  a  $T_2(\mu)$  předpisem

$$\begin{aligned} T_1(\mu)(t) &= \mu([0, t)), \\ T_2(\mu)(t) &= \mu([0, t]), \end{aligned} \quad \text{pro } t \in [0, 1].$$

- (1) Ukažte, že  $T_1$  a  $T_2$  jsou lineární operátory  $\mathcal{M}([0, 1])$  do  $BV([0, 1])$ .  
(2) Ukažte, že  $\|T_1\| = 1$  a najděte ker  $T_1$ .

- (3) Ukažte, že  $T_2$  je izometrie.  
(4) Je některý z operátorů  $T_1$  a  $T_2$  na?

**Návod:** (3) S použitím regularity měr z  $\mathcal{M}([0, 1])$  ukažte, že v definici totální variace těchto měr stačí brát disjunktní systémy polouzavřených intervalů. (4) Uvažte charakteristické funkce jednobodových množin.

**Příklad 30.** Nechť  $\mathcal{M}_c([0, 1])$  značí podprostor  $\mathcal{M}([0, 1])$  tvořený spojitými mírami (tj. mírami, které jsou nulové na jednobodových množinách).

- (1) Ukažte že  $\mathcal{M}_c([0, 1]) = \ker(T_1 - T_2)$ , kde  $T_1$  a  $T_2$  jsou jako v předchozím příkladu.
- (2) Nechť  $T$  je zúžení  $T_1$  (nebo  $T_2$ ) na  $\mathcal{M}_c([0, 1])$ . Ukažte, že  $T$  je izometrie  $\mathcal{M}_c([0, 1])$  do  $BV([0, 1])$  a že obor hodnot jsou právě spojité funkce z  $BV([0, 1])$ .
- (3) Ukažte, prostory  $\mathcal{M}_c([0, 1])$  a  $BV_c([0, 1])$  (tvořený spojitými funkciemi z  $BV([0, 1])$ ) jsou úplné.

#### K ODDÍLU I.3 – SKALÁRNÍ SOUČIN, HILBERTOVY PROSTORY

**Příklad 31.** Nechť  $X$  je komplexní vektorový prostor a nechť  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  je reálný skalární součin na  $X$  (tj. reálná funkce na  $X \times X$ , která splňuje podmínky (i), (iii)–(v) z definice a podmínu (ii) pro reálné  $\lambda$ ) a  $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$  pro  $x \in X$ . Nechť  $\|ix\| = \|x\|$  pro  $x \in X$ . Ukažte, že pak je  $\|\cdot\|$  norma na komplexním prostoru  $X$ , která je indukovaná (komplexním) skalárním součinem.

**Návod:** S použitím polarizační identity ukažte, že  $\langle x, ix \rangle = 0$  pro každé  $x \in X$ . Pak ukažte, že vzorec  $\langle x, y \rangle_C = \langle x, y \rangle + i \langle x, iy \rangle$  definuje skalární součin na  $X$  a  $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle_C$ .

**Příklad 32.** Nechť  $(X_n)$  je posloupnost Hilbertových prostorů. Nechť  $X$  je jejich  $\ell^2$ -suma (tj. prostor vzniklý postupem z Příkladu 20 pro  $p = 2$ ). Ukažte, že  $X$  je Hilbertův prostor.

**Návod:** Použijte rovnoběžníkové pravidlo.

#### K ODDÍLU I.4 – ŘADY V NORMOVANÝCH PROSTORECH

**Příklad 33.** Nechť  $(e_n)$  je posloupnost kanonických jednotkových vektorů v prostoru  $\ell^p$  nebo  $c_0$ .

- (1) Ukažte, že  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} e_n$  není absolutně konvergentní v žádném z těchto prostorů.
- (2) Ukažte, že  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} e_n$  je bezpodmínečně konvergentní v každém z těchto prostorů s výjimkou prostoru  $\ell^1$ .

**Příklad 34.** Nechť  $(x_n)$  je posloupnost v Banachově prostoru. Dokažte, že následující tvrzení jsou ekvivalentní:

- (i) Řada  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  je bezpodmínečně konvergentní.
- (ii) Pro každou posloupnost  $(\epsilon_n)$  znamének (tj. čísel 1 a  $-1$ ) řada  $\sum_{n=1}^{\infty} \epsilon_n x_n$  konverguje.
- (iii) Pro každou vybranou posloupnost  $(x_{n_k})$  řada  $\sum_{k=1}^{\infty} x_{n_k}$  konverguje.

**Návod:** (i)  $\Leftrightarrow$  (iii) Použijte Bolzano-Cauchyovu podmínu (Tvrzení I.29(a) z přednášky).

#### K ODDÍLU I.5 – HILBERTOVY PROSTORY, KOLMOST, NEJBЛИŽŠÍ PRVKY

**Příklad 35.** Nechť  $(\Omega, \Sigma, P)$  je pravděpodobnostní prostor a  $Y_1, Y_2$  jsou dvě nezávislé (reálné) náhodné veličiny s konečným druhým momentem a nulovou střední hodnotou. Ukažte, že  $Y_1$  a  $Y_2$  jsou kolmé prvky v prostoru  $L^2(P)$ .

**Návod:** Použijte definice příslušných pojmů z teorie pravděpodobnosti a vzorec pro střední hodnotu součinu nezávislých náhodných veličin.

### Příklad 36.

- (1) Ukažte na příkladu, že v neúplném prostoru se skalárním součinem maximální ortonormální systém nemusí být úplný.
- (2) Ukažte, že v separabilním prostoru se skalárním součinem existuje úplný ortonormální systém.

**Návod:** (1) Uvažte například lineární obal množiny  $\{e_2, e_3, \dots\} \cup \{\left(\frac{1}{n}\right)_{n=1}^{\infty}\}$  v  $\ell^2$ . (2) Použijte ortogonalizaci na lineárně nezávislou posloupnost s hustým lineárním obalem.

### K ODDÍLU I.6 – PROSTORY KONEČNÉ A NEKONEČNÉ DIMENZE

**Příklad 37.** Nechť  $X$  je normovaný lineární prostor konečné dimenze a  $C \subset X$  neprázdná uzavřená konvexní množina.

- (1) Ukažte, že pro každé  $x \in X$  existuje bod  $y \in C$  nejbližší k  $x$ .
- (2) Najděte příklad  $X, C$  a  $x$  takový, že k  $x$  existuje v  $C$  více nejbližších bodů.
- (3) Ukažte, že, pokud  $X = (\mathbb{F}^n, \|\cdot\|_p)$  pro  $p \in (1, \infty)$ , je nejbližší bod jednoznačně určen.

**Návod:** (1) Použijte kompaktnost omezených uzavřených množin. (2) Uvažte například  $X = (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_1)$ . (3) Ukažte, že pro tyto prostory jednotková sféra neobsahuje žádnou úsečku, a že z toho tvrzení plyne.

**Příklad 38.** Nechť  $(X, \|\cdot\|)$  je normovaný lineární prostor nekonečné dimenze. Ukažte, že na  $X$  existují normy  $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$  s vlastnostmi

- (a)  $\|\cdot\|_a \geq \|\cdot\|$  a přitom tyto dvě normy nejsou ekvivalentní;
- (b) identita na  $X$  není spojitá ani z  $\|\cdot\|$  do  $\|\cdot\|_b$  ani z  $\|\cdot\|_b$  do  $\|\cdot\|$ .

**Návod:** Modifikujte důkaz Tvrzení I.46(b) z přednášky.

### K ODDÍLU I.7 – REÁLNÉ A KOMPLEXNÍ PROSTORY

**Příklad 39.** Nechť  $H$  je reálný Hilbertův prostor nekonečné dimenze. Ukažte, že  $H$  je izometrický  $X_R$  pro nějaký komplexní Hilbertův prostor  $X$ .

**Návod:** Použijte Důsledek I.38 z přednášky.

**Příklad 40.** Nechť  $X = c_0(\mathbb{N}, \mathbb{R})$  nebo  $X = \ell^p(\mathbb{N}, \mathbb{R})$  pro  $p \in [1, \infty]$ . Ukažte, že na  $X$  existuje komplexní struktura, tj.  $X$  je izomorfní  $Y_R$  pro nějaký komplexní Banachův prostor.

**Návod:** Použijte Tvrzení I.48 z přednášky.

**Příklad 41.** (1) Nechť  $X$  je komplexní normovaný lineární prostor. Ukažte, že pro každé  $x \in X_R$  existuje podprostor  $X_R$  izometrický  $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$  obsahující  $x$ .  
(2) Nechť  $Y \subset\subset c_0(\mathbb{N}, \mathbb{R})$  je podprostor dimenze 2. Ukažte, že jednotková sféra  $Y$  obsahuje úsečku.  
(3) Ukažte, že  $c_0(\mathbb{N}, \mathbb{R})$  není izometrický  $X_R$  pro žádný komplexní prostor  $X$ .

**Návod:** (2) Jet  $Y = \text{span}\{x, y\}$  pro lineárně nezávislé  $x, y \in c_0(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ ,  $\|x\|_\infty = \|y\|_\infty = 1$ . Pokud existuje  $n$ , že  $|x_n| = |y_n| = 1$ , pak  $S_Y$  obsahuje bud' úsečku spojující  $x$  a  $y$  nebo úsečku spojující  $x$  a  $-y$ . V případě, že takové  $n$  neexistuje, označme  $F = \{n; |x_n| = 1\}$ . Nechť  $n \in F$  je takové, že  $|y_n - x_n|$  je nejmenší. BÚNO  $x_n = 1$  (jinak místo  $x$  a  $y$  uvažujme  $-x$  a  $-y$ ). Pak pro dost malé  $\varepsilon > 0$  je  $\|x + \varepsilon y\| = 1 + \varepsilon |y_n|$ . Odtud plyne existence úsečky na  $S_Y$ .

## DALŠÍ PŘÍKLADY SOUVISEJÍCÍ S ÚVODNÍ KAPITOLOU

**Příklad 42.** Nechť  $X$  je reálný normovaný lineární prostor dimenze  $n$  a  $A \subset X$ .

- (1) Ukažte, že pro každý  $x \in \text{co } A$  existují  $a_1, \dots, a_{n+1} \in A$ , že  $x \in \text{co } \{a_1, \dots, a_{n+1}\}$ .
- (2) Je-li  $A$  kompaktní, dokažte, že  $\text{co } A$  je také kompaktní.
- (3) Jaká varianta (1) platí pro komplexní prostory?

**Návod:** (2) Použijte známá fakta, že kartézský součin kompaktních množin je kompaktní množina a že spojity obraz kompaktní množiny je kompaktní množina. S využitím (1) vyjádřete  $\text{co } A$  jako spojity obraz  $A^{n+1} \times K$ , kde  $K$  je vhodná kompaktní podmnožina  $\mathbb{R}^{n+1}$ .

**Příklad 43.** Nechť  $X$  je normovaný lineární prostor a  $A \subset X$  je kompaktní.

- (1) Ukažte, že  $\overline{\text{co } A}$  je kompaktní.
- (2) Ukažte na protipříkladu, že  $\text{co } A$  nemusí být kompaktní.

**Návod:** (1) Ukažte, že  $\text{co } A$  je totálně omezená. (2) Využijte fakt, že, pokud  $x_n \rightarrow x$ , pak množina  $\{x\} \cup \{x_n; n \in \mathbb{N}\}$  je kompaktní.

**Příklad 44.** Nechť  $X$  je reálný normovaný lineární prostor konečné dimenze a  $A \subset X$  je konvexní množina splňující  $\text{span } A = X$ . Ukažte, že  $A$  má neprázdný vnitřek v  $X$ .

**Návod:** BÚNO  $0 \in A$ . Nechť  $a_1, \dots, a_n \in A$  je báze  $X$ . Ukažte, že  $\frac{1}{n+1}(a_1 + \dots + a_n)$  je vnitřní bod  $A$ . (Uvažte duální bázi a použijte, že všechny lineární funkcionály jsou spojité – Důsledek I.42(e) z přednášky.)

**Příklad 45.** Nechť  $X$  je Banachův prostor a  $A \subset X$  je omezená množina. Označme

$$\text{co}_\sigma A = \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} t_n a_n; a_n \in A, t_n \in [0, 1] \text{ pro } n \in \mathbb{N}, \sum_{n=1}^{\infty} t_n = 1 \right\}.$$

- (1) Ukažte, že všechny uvedené řady konvergují v  $X$ .
- (2) Ukažte, že  $\text{co } A \subset \text{co}_\sigma A \subset \overline{\text{co } A}$ .
- (3) Ukažte na protipříkladech, že nemusí platit rovnost.

**Návod:** (3) Pro první inkluzi použijte stejný protipříklad jako v Příkladu 43, pro druhou uvažte například otevřenou kouli.