I. Nerovnosti, indukce – opakování

1. Řešte následující nerovnosti v $\mathbb{R}$: $\dfrac{x-2}{2x-8} \geq 1$, $\quad \log_{\frac{1}{3}}(x^2-3x+3) \geq 0$, $\quad \dfrac{x+2}{x+3} > \dfrac{2x+3}{x+6}$.

2. Nakreslete graf funkce: $f(x) = ||||x|-1|-1|-1|$.

3. Dokažte následující formulky:

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \quad x > -1, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^3 = (1+2+3+\cdots+n)^2.$$

4. Vyjádřete $\cos 5x$ (resp. $\sin 5x$) pouze pomocí funkcí $\cos x$ a $\sin x$.

5. Dokažte pro $a, b \in \mathbb{R}$: $|a+b| \leq |a|+|b|$, $\quad ||a|-|b|| \leq |a-b|$.

6. Pro všechna $n \in \mathbb{N}$, $n \neq 3$ platí $n^2 \leq 2^n$. Dokažte!

7. Řešte rovnice: $\sin 2x = \sin x$, $\quad 2\sin x + \cos x = 1$, $\quad \log(x^2+1) = 2\log(3-x)$.

– –

Výsledky a návody. **1.** $(4,6\rangle$; $\langle 2,3\rangle$, $(-6,-3) \cup (\frac{-1-\sqrt{13}}{2}, \frac{-1+\sqrt{13}}{2})$

2.



3. Použijte matematickou indukci. **4.** $\cos 5x = \cos^5 x - 10\cos^3 x \sin^2 x + 5\cos x \sin^4 x$; $\sin 5x = 5\cos^4 x \sin x - 10\cos^2 x \sin^3 x + \sin^5 x$. **5.** Proveďte rozbor možností pro znaménka. Druhou nerovnost odvoďte z první. **6.** Použijte matematickou indukci. **7.** $x \in \{k\pi, \frac{\pi}{3}+2k\pi, \frac{5}{3}\pi+2k\pi\}$ pro $k \in \mathbb{Z}$; $x \in \{2k\pi, \pi - \arcsin\frac{4}{5} + 2k\pi\}$ pro $k \in \mathbb{Z}$; $x = \frac{4}{3}$.

═══

II. Výroková logika

1. Nechť M značí množinu všech mužů a $\check{Z}$ množinu všech žen. Uvažujme následující výrokové formy: $S(m,\check{z})$: „Muž m je manželem ženy $\check{z}$.“; $L_1(m,\check{z})$: „Muž m miluje ženu $\check{z}$.“; $L_2(m,\check{z})$: „Žena $\check{z}$ miluje muže m.“. Pomocí kvantifikátorů, logických spojek a forem S, L_1 a L_2 zapište následující výroky:

a) Každý ženatý muž miluje svou manželku. b) Každou ženu miluje nějaký muž.

c) Každá žena má nejvýš jednoho manžela.

d) Každý muž má nejvýš jednu manželku. (Říká tento výrok totéž, co c)?)

e) Existuje vdaná žena. f) Existuje ženatý muž. (Říká tento výrok totéž, co e)?)

g) Existují nevěrné manželky. (Manželku prohlásíme za nevěrnou, pokud miluje jiného muže než svého manžela.)

Následující výroky přeložte do češtiny.

h) $\exists m \in M \forall \check{z} \in \check{Z}(non\, S(m,\check{z}))$; i) $\exists \check{z} \in \check{Z} \forall m \in M(L_1(m,\check{z}) \Rightarrow non\, L_2(m,\check{z}))$;

j) $\exists \check{z} \in \check{Z} \forall m \in M(L_2(m,\check{z}) \Rightarrow non\, L_1(m,\check{z}))$;

k) $\forall \check{z} \in \check{Z}((\exists m \in M : L_2(m,\check{z})) \Rightarrow (\exists m \in M : L_1(m,\check{z}) \ \&\ non\, L_2(m,\check{z}))$.

2. Rozhodněte o správnosti následujících výroků a napište jejich negace.

a) $\forall x \in \mathbb{N}\ \exists y \in \mathbb{N}\ \forall z \in \mathbb{N}(z > x \Rightarrow y < z)$; b) $\exists y \in \mathbb{N}\ \forall x \in \mathbb{N}\ \forall z \in \mathbb{N}\ (z > x \Rightarrow y < z)$;

c) $\exists x \in \mathbb{N}\ \forall y \in \mathbb{N}\ \forall z \in \mathbb{N}(z > x \Rightarrow y < z)$; d) $\exists x \in \mathbb{N}\ \forall y \in \mathbb{N}\ \forall z \in \mathbb{N}(z < x \Rightarrow y > z)$;

e) $\forall a \in \mathbb{R}\ \exists \varepsilon > 0\ \exists \alpha \in \mathbb{R}\ \forall x \in \mathbb{R}(x \in (a, a+\varepsilon) \Leftrightarrow |x-\alpha| < 1)$;

f) $\exists a \in \mathbb{R}\ \forall \varepsilon > 0\ \forall \alpha \in \mathbb{R}\ \exists x \in \mathbb{R}(x \in (a, a+\varepsilon) \Leftrightarrow |x-\alpha| < 1)$.

3. Vyjádřete co nejjednodušeji: a) $\forall \varepsilon > 0\ \forall y \in \mathbb{R} : |y-7| < 5 \Rightarrow |f(y)-15| < \varepsilon$; b) $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists \delta > 1 \forall y \in \mathbb{R}\ \forall n \in \mathbb{N} : |y-x| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(y)| < \varepsilon$.

4. Hádanky z ostrova poctivců a padouchů: a) Jdete kolem tří obyvatel ostrova a zeptáte se:„Kolik je mezi vámi poctivců?“ A odpoví nezřetelně a tak se zeptáte obyvatele B: „Co říkal A?“ B odpoví: „A říkal,že mezi námi je jediný poctivec.“ Nato řekne C: „Nevěřte B, ten lže!“ Co jsou B a C? b) Dejme tomu, že A řekne: „Buď já jsem padouch nebo B je poctivec.“ Co jsou A a B? c) Dejme tomu, že A řekne: „Já jsem padouch, ale B ne.“ Co jsou A a B? d) A řekne: „B a C mají stejnou povahu.“ Nato se někdo zeptá C: „Mají A a B stejnou povahu?“ Co C odpoví?

– – – –

IV. Spočtěte následující limity posloupností

1. $\lim_{n\to\infty} \frac{2n^2+n-3}{n^3-1}$ **2.** $\lim_{n\to\infty} \frac{2n^3+6n}{n^3-7n+7}$ **3.** $\lim_{n\to\infty} \frac{2n^5+3n-2}{n^5-3n^3+1}$ **4.** $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$

5. $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt[3]{n+11}-\sqrt[3]{n}\right)$ **6.** $\lim_{n\to\infty} (-1)^n\sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$ **7.** $\lim_{n\to\infty} \frac{3^n+n^5}{n^6+n!}$ **8.** $\lim_{n\to\infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2}$

9. $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1+2+\cdots+n}{n+2}-\frac{n}{2}\right)$ **10.** $\lim_{n\to\infty} \frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3}$ **11.** $\lim_{n\to\infty} \frac{1^3+2^3+\cdots+n^3}{n^4}$ **12.** $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a}$, $(a\geq 0)$

13. $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n}$ **14.** $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}$ **15.** $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{2^n}$ **16.** $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{n!}$

Výsledky a návody. **1.** 0 **2.** 2 **3.** 2 **4.** 0 (rozšiřte vhodným výrazem) **5.** 0 **6.** Nemá limitu. **7.** 0 **8.** $\frac{1}{2}$ **9.** $\frac{1}{2}$ **10.** $\frac{1}{3}$ **11.** $\frac{1}{4}$ **12.** 1 pro $a>0$, 0 pro $a=0$ (pro $a>0$ pište $\sqrt[n]{a}=1+\delta_n$ a ukažte, že $\delta_n\to 0$) **13.** 1 (pište $\sqrt[n]{n}=1+\delta_n$ a ukažtem že $\delta_n\to 0$) **14.** 1 **15.** 0 **16.** 0

==========

V. Spočtěte limity posloupností

1. $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{A^n+B^n+C^n}$, $(A,B,C>0)$ **2.** $\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{k=1}^{n}[kx]}{n^2}$, $x\in\mathbb{R}$ **3.** $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!}$

4. $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$ **5.** $\lim_{n\to\infty} \frac{n+[\sqrt[3]{n}]^3}{n-[\sqrt{n+9}]}$ **6.** $\lim_{n\to\infty} \frac{i}{n}\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^n$

7. $\lim_{n\to\infty} a_n$, kde $a_1=\sqrt{2}$, $a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$ ***8.** $\lim_{n\to\infty} a_n$, kde $a_1=\sqrt{2}$, $a_{n+1}=\sqrt{2-a_n}$

***9.** Pro která $x\in\mathbb{R}$ existuje $\lim_{n\to\infty} \sin nx$? Totéž pro $\lim_{n\to\infty} \cos nx$.

Výsledky a návody. **1.** $\max\{A,B,C\}$ **2.** $\frac{x}{2}$ **3.** $+\infty$ **4.** 1 **5.** 1 **6.** 0 **7.** 2 (ukažte, že posloupnost a_n je neklesající a omezená, a tudíž má limitu, a pak odvoďte, že tato limita musí být 2) **8.** 1 (ukažte, že posloupnost lichých členů i posloupnost sudých členů jsou monotónní a omezené, a že mají tutéž limitu 1) **9.** $\lim_{n\to\infty} \sin nx$ existuje jen pro $x=k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$; $\lim_{n\to\infty} \cos nx$ existuje jen pro $x=2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ (využijte toho, že pokud $\lim_{n\to\infty} \sin nx$ existuje, pak $\lim_{n\to\infty} \sin(n+2)x-\sin nx=0$, a pak ještě podobně pro $\cos nx$)

==========

VI. Spočtěte limity

1. $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n}(\sqrt[n]{3}-\sqrt[n]{2})$ **2.** $\lim_{n\to+\infty} (\sqrt[3]{\sqrt{n^7}+\sqrt[3]{n^7}}-\sqrt[3]{\sqrt{n^7}-\sqrt[3]{n^7}})$ **3.** $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1-\frac{1}{(n+1)^2}\right)$

4. Spočtěte v závislosti na $k,l\in\mathbb{N}$ a) $\lim_{n\to\infty} \frac{n^k-(n-1)^l}{n^k+n^l}$; b) $\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^k+(-n)^l}{(n-1)^k-n^l}$.

5. Dokažte, že součin $\frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{5}\cdot\ldots$ má konečnou nenulovou hodnotu.

***6.** Dokažte, že $\lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{k} a_i\sqrt{n+i}=0$, pokud $\sum_{i=0}^{k} a_i=0$

Výsledky a návody. **1.** 0 (vhodně rozšiřte a jmenovatele odhadněte). **2.** $\frac{2}{3}$ **3.** $\frac{1}{2}$ (vyjádřete jednoduše $\prod_{n=1}^{k}(1-\frac{1}{(n+1)^2})$ a spočtěte limitu této posloupnosti) **4.** a) 1, pokud $k>l$; -1, pokud $k<l$; 0, pokud $k=l$. b) 1, pokud $k>l$; $(-1)^l$, pokud $k<l$; $-\infty$, pokud $k=l$ je sudé; -1, pokud $k=l$ je liché. **5.** Použijte větu o limitě monotónní posloupnosti. **6.** Dokazujte matematickou indukcí v závislosti na k. Pro $k=2$ proveďte vhodné rozšíření.

VII. Spočtěte limity nebo dokažte, že neexistují

1. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(1+x)(1+2x)(1+3x)-1}{x}$ **2.** $\lim\limits_{x\to 3}\frac{x^2-5x+6}{x^2-8x+15}$ **3.** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x}-\sqrt[3]{1-x}}$ **4.** $\lim\limits_{x\to 7}\frac{\sqrt{x+2}-\sqrt[3]{x+20}}{\sqrt[4]{x+9}-2}$

5. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(1+mx)^n-(1+nx)^m}{x^2}$, $(m,n\in\mathbb{N})$ **6.** $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x+x^2+\cdots+x^n-n}{x-1}$, $(n\in\mathbb{N})$ **7.** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt[n]{1+x}-1}{x}$

8. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt[m]{1+ax}-\sqrt[n]{1+bx}}{x}$, $(m,n\in\mathbb{N},a,b\in\mathbb{R})$ **9.** $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^m-1}{x^n-1}$, $(m,n\in\mathbb{N})$ **10.** $\lim\limits_{x\to 1}([x]-x)$

11. $\lim\limits_{x\to 0}x\cdot\left[\frac{1}{x}\right]$ **12.** $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\frac{2\sin^2 x+\sin x-1}{2\sin^2 x-3\sin x+1}$ **13.** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$ **14.** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg} x}{x}$ **15.** $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}{1-2\cos x}$

16. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 5x-\sin 3x}{\sin x}$ **17.** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin\alpha x}{\sin\beta x}$ **18.** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1+\sin x-\cos x}{1-\sin x-\cos x}$ **19.** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2}{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}$

20. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$ **21.** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\log(\cos\alpha x)}{\log(\cos\beta x)}$

Výsledky a návody. **1.** 6 **2.** $-\frac{1}{2}$ **3.** $\frac{3}{2}$ **4.** $\frac{112}{27}$ **5.** $\frac{1}{2}mn(n-m)$ **6.** $\frac{1}{2}n(n+1)$ **7.** $\frac{1}{n}$ **8.** $\frac{an-bm}{mn}$ **9.** $\frac{m}{n}$ **10.** Limita neexistuje (zleva -1, zprava 0). **11.** 1 **12.** -3 **13.** $\frac{1}{2}$ **14.** 1 **15.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$ **16.** 2 **17.** $\frac{\alpha}{\beta}$, pokud $\beta\neq 0$. **18.** -1 **19.** $\frac{4}{3}$ **20.** $-\frac{1}{12}$ **21.** $\frac{\alpha^2}{\beta^2}$, pokud $\beta\neq 0$

==========

VIII. Spočtěte následující limity:

1. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\log\cos x}{x^2}$ **2.** $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+2}{2x+1}\right)^{x^2}$ **3.** $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+1}{x^2-2}\right)^{x^2}$ **4.** $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+x^2\right)^{\operatorname{cotg}^2 x}$

5. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+\operatorname{tg} x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$ **6.** $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\log\left(x^2-x+1\right)}{\log(x^{10}+x+1)}$ **7.** $\lim\limits_{x\to 0}x\cdot\sqrt{\left|\cos\frac{1}{x}\right|}$ **8.** $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\log\left(1+\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}\right)}{\log\left(1+\sqrt[3]{x}+\sqrt[4]{x}\right)}$

9. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\operatorname{tg} x^{\operatorname{tg} 2x}$ **10.** $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x-\cos x}{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^2}$ **11.** $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x-\cos x}{\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^3}$ **12.** $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+x\cdot 2^x}{1+x\cdot 3^x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$

13. $\lim\limits_{x\to+\infty}\log(1+2^x)\cdot\log\left(1+\frac{3}{x}\right)$ **14.** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin(\sin(\sin x))}{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos x\right)}\cdot x^k$, $k\in\mathbb{Z}$

15. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\sqrt{x+1}-\cos\sqrt{x-1}\right)$, **16.** $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\operatorname{tg} 2x\cdot\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}-x\right)$

17. Najděte $a,b\in\mathbb{R}$, aby platilo $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2-x+1}-ax-b\right)=0$.

Výsledky a návody. **1.** $-\frac{1}{2}$ **2.** 0 **3.** e^3 **4.** e **5.** 1 **6.** $\frac{1}{5}$ **7.** 0 **8.** $\frac{3}{2}$ **9.** $\frac{1}{e}$ **10.** limita neexistuje. **11.** $+\infty$ **12.** $\frac{2}{3}$ **13.** $3\log 2$ **14.** 0 pro $k>1$, $\frac{1}{\pi}$ pro $k=1$, $+\infty$ pro $k<1$ liché, neexistuje pro $k<1$ sudé. **15.** 0 **16.** $\frac{1}{2}$ **17.** $a=-1,b=\frac{1}{2}$

==========

IX. Spočtěte limity

1. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}$ **2.** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{\sin(\sin x)}$ **3.** $\lim\limits_{x\to 1-}\frac{\arccos x}{(1-x)^\alpha}$ **4.** $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sin^2(\pi\cdot 2^x)}{\log\cos(\pi\cdot 4^x)}$ **5.** $\lim\limits_{x\to 0+}\frac{\arccos\frac{1-x^2}{1+x^2}}{\sin x}$

6. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(\cos x)^x-\sqrt{1+\sin^3 x}}{x^3}$ **7.** $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^{x-1}+\sqrt[3]{\cos\pi x}}{\log^2 x}$ **8.** $\lim\limits_{x\to 0+}(e^x-1)^{\frac{(\operatorname{tg} x)^2}{x^\alpha}}$

Výsledky a návody. **1.** 1 **2.** 1 **3.** 0 pro $\alpha<\frac{1}{2}$, $\sqrt{2}$ pro $\alpha=\frac{1}{2}$, $+\infty$ pro $\alpha>\frac{1}{2}$ **4.** 2 **5.** -1 **6.** $1+\frac{3}{2}\pi^2$ **7.** 1 pro $\alpha<2$, 0 pro $\alpha\geq 2$

==========

X. Vyšetřete spojitost a najděte derivaci funkce $f(x)=$

1. $(x^2+51x+119)^{87}$ **2.** $(x+15)^3(x-17)^{10}x^9$ **3.** $\frac{e^{x^2+1}\cdot\cos x}{(x+1)^2\cdot\log(x^2+1)}$ **4.** $\log(x^2+x+1)$

5. $\sin\left(\cos\left((x^3+17x^2-56x+1)^{18}\right)\right)$ **6.** x^x **7.** $\left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$ **8.** $(\sin x)^{\cos x}$ **9.** $\arcsin(\sin x)$

10. $\log\arccos x$ **11.** $x\arcsin\sqrt{\frac{x}{x+1}}+\operatorname{arctg}\sqrt{x}-\sqrt{x}$ **12.** $\operatorname{arctg} e^x-\log\sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x}+1}}$

13. $\operatorname{arctg}\sqrt{x^2-1}-\frac{\log x}{\sqrt{x^2-1}}$ **14.** $(\operatorname{arctg} x)^{\arcsin x}$ **15.** $f(x)=e^{\frac{1}{\log|x|}}$

16. Spočtěte limity a) $\lim\limits_{x\to a}\frac{x^x-a^a}{x-a}$, $(a>0)$, b) $\lim\limits_{x\to 0}(x+e^x)^{\frac{1}{x}}$.

Výsledky a návody. **1.** f je definována a spojitá na $\mathbb{R}$, $f'(x) = 87(x^2+51x+119)^{86}\cdot(2x+51)$. **2.** f je definována a spojitá na $\mathbb{R}$, $f'(x) = 3(x+15)^2(x-17)^{10}x^9 + 10(x+15)^3(x-17)^9x^9 + 9(x+15)^3(x-17)^{10}x^8$. **3.** f je definována a spojitá na $(-\infty,-1)\cup(-1,0)\cup(0,+\infty)$, $f'(x) = \frac{\left((2x+1)e^{x^2+1}\cdot\cos x - e^{x^2+1}\cdot\sin x\right)\cdot(x+1)\cdot\log(x^2+1) - e^{x^2+1}\cdot\cos x\cdot\left(2\cdot\log(x^2+1)+\frac{2x(x+1)}{x^2+1}\right)}{(x+1)^3\cdot\log^2(x^2+1)}$. **4.** f je definována a spojitá na $\mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+1}$ **5.** f je definována a spojitá na $\mathbb{R}$, $f'(x) = -18\cos\left(\cos\left((x^3+17x^2-56x+1)^{18}\right)\right)\cdot\sin\left((x^3+17x^2-56x+1)^{18}\right)\cdot(x^3+17x^2-56x+1)^{17}\cdot(3x^2+34x-56)$. **6.** f je definována a spojitá na $(0,\infty)$, $\lim\limits_{x\to0+} f(x) = 1$, lze tedy spojitě dodefinovat na $[0,\infty)$. $f'(x) = x^x(\log x+1)$ pro $x>0$. Po dodefinování platí $f'_+(0) = -\infty$. **7.** f je definována a spojitá na $(0,\infty)$, $\lim\limits_{x\to0+} f(x) = +\infty$, nelze spojitě rozšířit. $f'(x) = \left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x}+2}\cdot(\log x - 1)$ pr $x>0$. **8.** f je definována a spojitá na $\bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}}(2k\pi,(2k+1)\pi)$. $\lim\limits_{x\to2k\pi+} f(x) = 0$, $\lim\limits_{x\to(2k+1)\pi-} f(x) = +\infty$, lze tedy spojitě rozšířit na $\bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}}\langle 2k\pi,(2k+1)\pi)$. $f'(x) = (\sin x)^{\cos x}\cdot(\frac{\cos^2 x}{\sin x} - \sin x\log\sin x)$ pro $x\in\bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}}(2k\pi,(2k+1)\pi)$. Po dodefinování je $f'_+(2k\pi) = 1$. **9.** f je definována a spojitá na $\mathbb{R}$. $f'(x) = 1$ pro $x\in(-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi)$, $f'(x) = -1$ pro $x\in(\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{3}{2}\pi+2k\pi)$, $f'_-(\frac{\pi}{2}+2k\pi) = f'_+(-\frac{\pi}{2}+2k\pi) = 1$, $f'_+(\frac{\pi}{2}+2k\pi) = f'_-(-\frac{\pi}{2}+2k\pi) = -1$ $(k\in\mathbb{Z})$. **10.** f je definována a spojitá na $\langle-1,1)$, $\lim\limits_{x\to1-} f(x) = -\infty$. $f'(x) = -\frac{1}{\arccos x\cdot\sqrt{1-x^2}}$ pro $x\in(-1,1)$, $f'_+(-1) = -\infty$. **11.** f je definována a spojitá na $\langle0,+\infty)$. $f'(x) = \arcsin\sqrt{\frac{x}{x+1}}$ pro $x>0$, $f'_+(0) = 0$. **12.** f je definována a spojitá na $\mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{e^x-1}{e^{2x}+1}$ pr $x\in\mathbb{R}$. **13.** f je definována a spojitá na $(1,\infty)$, $\lim\limits_{x\to1+} f(x) = 0$, lze tedy spojitě rozšířit na $\langle1,\infty)$. $f'(x) = \frac{x\log x}{(x-1)^{\frac{3}{2}}}$ pro $x>1$, po dodefinování je $f'_+(-1) = +\infty$. **14.** f je definována a spojitá na $(0,1\rangle$, $\lim\limits_{x\to0+} f(x) = 1$, lze tedy spojitě dodefinovat na $\langle0,1\rangle$. $f'(x) = (\operatorname{arctg} x)^{\arcsin x}\cdot(\frac{\log\operatorname{arctg} x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{\arcsin x}{(1+x^2)\operatorname{arctg} x})$ pro $x\in(0,1)$, $f'_-(1) = +\infty$, po dodefinování je $f'_+(0) = -\infty$. **15.** f je definována a spojitá na $(-\infty,-1)\cup(-1,0)\cup(0,1)\cup(1,\infty)$, $\lim\limits_{x\to0} f(x) = 1$, $\lim\limits_{x\to1-} f(x) = \lim\limits_{x\to-1+} f(x) = 0$, $\lim\limits_{x\to1+} = \lim\limits_{x\to-1-} f(x) = +\infty$. Funkce f lze tedy rozšířit na celé $\mathbb{R}$ tak, že bude spojitá všude kromě bodů ±1, a navíc bude spojitá v bodě 1 zleva a v bodě -1 zprava. $f'(x) = -e^{\frac{1}{\log|x|}}\cdot\frac{1}{x\log^2|x|}$ pro $x\neq0,\pm1$. Po dodefinování je $f'_+(0) = -\infty$, $f'_-(0) = +\infty$, $f'_-(1) = f'_+(-1) = 0$. **16.** a) $a^a(\log a+1)$, b) e^2.

XI. Příklady na průběh funkcí

1. $f(x) = \frac{2x}{1-x^2}$ **2.** $f(x) = x\sqrt{1-x^2}$ **3.** $f(x) = \sqrt[3]{x^3-x^2-x+1}$ **4.** $f(x) = \sqrt[3]{x^2} - \frac{2}{\sqrt{x}}$ **5.** $f(x) = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x^2+1}$ **6.** $f(x) = \frac{x^4+8}{x^3+1}$ **7.** $f(x) = (x+1)^{\frac{2}{3}} + (x-1)^{\frac{2}{3}}$ **8.** $f(x) = \frac{|x+1|^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}$ **9.** $f(x) = 1 - x + \sqrt{\frac{x^3}{3+x}}$ **10.** $f(x) = \sin x + \cos^2 x$ **11.** $f(x) = |\sin x| + \cos 2x$ **12.** $f(x) = \exp(-x^2+3x-7)$ **13.** $f(x) = \arcsin(\cos^2 x)$

Výsledky a návody.

1.



2.



3.



5.



7.



Průběh funkce $f(x)=\frac{x^4+8}{x^3+1}$ - příklad XI/6

1. $D_f=(-\infty,-1)\cup(1,\infty)$, f je spojitá na svém definičním oboru. Navíc zřejmě $f(x)>0$ pro $x>-1$ a $f(x)<0$ pro $x<-1$.

2. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$, $\lim\limits_{x\to-1-} f(x)=-\infty$, $\lim\limits_{x\to-1+}=+\infty$.

3. Pro $x\in D_f$ platí: $f'(x)=\frac{x^2(x-2)(x^3+2x^2+4x+12)}{(x^3+1)^2}$. Vyšetřeme znaménko derivace. K tomu nejprve vyšetřeme funkci $g(x)=x^3+2x^2+4x+12$.

Tato je spojitá na $\mathbb{R}$, stejně jako její derivace. Platí $g'(x)=3x^2+4x+4$. Diskriminant této funkce je $4^2-4\cdot4\cdot3=-32<0$, tedy $g'(x)>0$ pro všechna $x\in\mathbb{R}$, a tedy g je rostoucí na $\mathbb{R}$. Protože $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=-\infty$ a $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$, má funkce g právě jeden reálný kořen. Označme ho α. Protože $g(0)=12>0$, je $\alpha<0$. Pro přesnější určení si povšimněme, že $g(-2)=4>0$ a $g(-3)=-9<0$, a tedy $\alpha\in(-3,-2)$. Analýzou znaménka $f'(x)$ a použitím věty o vztahu derivace a monotonie dostaneme tabulku:

x	$-\infty$		α		-1		0		2		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$f(\alpha)$	$\searrow$	$-\infty \parallel +\infty$	$\searrow$	8	$\searrow$	$\frac{8}{3}$	$\nearrow$	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$-$	0	$+$	

Ještě můžeme alespoň zhruba odhadnout $f(\alpha)$. Platí $f(-2)=-\frac{24}{7}\in(-4,-3)$ a $f(-3)=-\frac{89}{26}\in(-4,-3)$. Máme tedy $f(\alpha)>-4$ (dokonce $f(\alpha)>-\min(\frac{24}{7},\frac{89}{26})$). Určitě víme, že $f(\alpha)<0$ (protože $\alpha<-1$). S libovolnou přesností ho můžeme odhadnout následující metodou. Zřejmě obor hodnot funkce f je $(-\infty,f(\alpha)]\cup[\frac{8}{3},+\infty)$, a tedy pro libovolné $c<0$ máme $f(\alpha)\geq c$, právě když f nabývá hodnoty c. Zkoumejme tedy rovnici $f(x)=c$. Ta má řešení, právě když $P_c(x)=x^4-cx^3-c+8$ má nějaký kořen. Přitom $P_c'(x)=4x^3-3cx^2=x^2(4x-3c)$. Odtud vidíme, že P_c má globální minimum v bodě $x=\frac{3}{4}c$. Spočtěme $P_c(\frac{3}{4}c)=-\frac{27}{256}c^4-c+8$. Protože pro $c=-3$ vyjde $P_c(\frac{3}{4}c)>0$, je $f(\alpha)<-3$ (ve skutečnosti je $f(\alpha)$ (jediným záporným) kořenem rovnice $P_c(\frac{3}{4}c)=0$). Nám může stačit, že $f(\alpha)\in(-4,-3)$.

4. Pro $x\in D_f$ je $f'(x)=\frac{-6x(x^4-2x-16x^3+8)}{(x^3+1)^3}$. Abychom zjistili, jak je to se znaménkem f'', zkoumejme nejprve funkci $h(x)=x^4-2x-16x^3+8$.

Platí: $h'(x)=4x^3-2-48x^2$, $h''(x)=12x^3-96x=12x(x-8)$.

Tedy: h' roste na $(-\infty,0]$, klesá na $[0,8]$, roste na $[8,+\infty]$. Máme $h'(0)=-2$, a tedy $h'<0$ na $(-\infty,8]$. Protože $h'(8)<0$ a $\lim\limits_{x\to+\infty} h'(x)=+\infty$, má funkce h' jediný kořen β, a platí pro něj $\beta>8$.

Tedy: Funkce h klesá na $(-\infty,\beta]$ a roste na $[\beta,+\infty)$. Platí $h(0)=8>0$, $h(1)=-9<0$, h má tedy kořen $\gamma\in(0,1)$. Protože $h(\beta)<h(1)<0$, má funkce h ještě jeden kořen $\delta>\beta$. Z výše uvedených faktů o monotonii jsou γ,δ jediné dva kořeny funkce h. Nyní můžeme doplnit tabulku:

x	$-\infty$		α		-1		0		β		2		δ		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$f(\alpha)$	$\searrow$	$-\infty \parallel +\infty$	$\searrow$	8	$\searrow$	$f(\beta)$	$\searrow$	$\frac{8}{3}$	$\nearrow$	$f(\delta)$	$\nearrow$	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$-$	$f'(\beta)$	$-$	0	$+$	$f'(\delta)$	$+$	
$f''(x)$		$-$	$-$	$-$		$+$	0	$-$	0	$+$	$+$	$+$	0	$-$	

Ještě můžeme zjistit, že $\delta\in(16,17)$, $f(\delta)\in(0,4)$ a $f(\gamma)\in(\frac{9}{2},8)$.

5. Funkce f má v $+\infty$ i v $-\infty$ asymptotu $y=x$.

6. Graf:



XII. Spočtěte parciální derivace funkcí všude, kde existují

7. $x^m y^n$ **8.** e^{xy} **9.** $xy+yz+zx$ **10.** $\sqrt{x^2+y^2}$ **11.** $\sqrt[3]{x^3+y^3}$ **12.** $|x|\cdot|y|$ **13.** $\sqrt[3]{xy}$
14. $|y-\sin x|$ **15.** $|\sin y-\sin x|$ **16.** $\sqrt[3]{x+y^2}$ **17.** $f(x,y)=\sqrt[3]{x^2+y}\cdot\ln(x^2+y^2)$, $f(0,0)=0$
18. $f(x,y)=e^{\frac{-1}{x^2+xy+y^2}}$, $f(0,0)=0$ **19.** $\left(\frac{x}{y}\right)^z$ **20.** $x^{\frac{y}{z}}$ **21.** x^{y^z}

Výsledky a návody. **7.** $\frac{\partial f}{\partial x}=mx^{m-1}y^n$, $\frac{\partial f}{\partial y}=nx^m y^{n-1}$ pro $(x,y)\in\mathbb{R}^2$. **8.** $\frac{\partial f}{\partial x}=ye^{xy}$, $\frac{\partial f}{\partial y}=xe^{xy}$ pro $(x,y)\in\mathbb{R}^2$. **9.** $\frac{\partial f}{\partial x}=y+z$, $\frac{\partial f}{\partial y}=x+y$, $\frac{\partial f}{\partial z}=x+y$ pro $(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$. **10.** $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$, pokud $(x,y)\neq(0,0)$. $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ a $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$ neexistují. **11.** $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=\frac{x^2}{\sqrt[3]{x^3+y^3}}$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=\frac{y^2}{\sqrt[3]{x^3+y^3}}$, pokud $y\neq -x$. $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)=\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)=1$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x,-x)$ a $\frac{\partial f}{\partial y}(x,-x)$ neexistují pro $x\neq 0$. **12.** $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=|y|\operatorname{sgn}x$ pro $x\neq 0$. $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=|x|\operatorname{sgn}y$ pro $y\neq 0$. $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)=\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)=0$. $\frac{\partial f}{\partial x}(0,y)$ pro $y\neq 0$ a $\frac{\partial f}{\partial y}(x,0)$ pro $x\neq 0$ neexistují. **13.** $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=\frac{\sqrt[3]{y}}{3\sqrt[3]{x^2}}$ pro $x\neq 0$. $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=\frac{\sqrt[3]{x}}{3\sqrt[3]{y^2}}$ pro $y\neq 0$. $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)=\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)=0$. $\frac{\partial f}{\partial x}(0,y)$ pro $y\neq 0$ a $\frac{\partial f}{\partial y}(x,0)$ pro $x\neq 0$ neexistují. **14.** $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=-\operatorname{sgn}(y-\sin x)\cdot\cos x$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=\operatorname{sgn}(y-\sin x)$, pokud $y\neq\sin x$. $\frac{\partial f}{\partial y}(x,\sin x)$ neexistuje pro $x\in\mathbb{R}$. $\frac{\partial f}{\partial x}(\frac{\pi}{2}+k\pi,(-1)^k)=0$ pro $k\in\mathbb{Z}$. $\frac{\partial f}{\partial x}(x,\sin x)$ neexistuje pro $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$. **15.** $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=\cos x\operatorname{sgn}(\sin x-\sin y)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=-\cos y\operatorname{sgn}(\sin x-\sin y)$, pokud $\sin x\neq\sin y$. $\frac{\partial f}{\partial x}(\frac{\pi}{2}+k\pi,\frac{\pi}{2}+l\pi)=\frac{\partial f}{\partial y}(\frac{\pi}{2}+k\pi,\frac{\pi}{2}+l\pi)=0$. V ostatních bodech parciální derivace neexistují. **16.** $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=\frac{1}{3\sqrt[3]{x+y^2}}$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=\frac{2y}{3\sqrt[3]{x+y^2}}$, pokud $x\neq -y^2$, $\frac{\partial f}{\partial x}(-x^2,x)$ a $\frac{\partial f}{\partial y}(-x^2,x)$ neexistují pro $x\in\mathbb{R}$. **17.** V $(x,-x^2)$ neexistují parciální derivace pokud $x^2+x^4\neq 1$, pokud $x^2+x^4=1$, jsou obě parciální derivace nulové. **18.** $\frac{\partial f}{\partial x}=e^{\frac{-1}{x^2+xy+y^2}}\cdot\frac{2x+y}{(x^2+xy+y^2)^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}=e^{\frac{-1}{x^2+xy+y^2}}\cdot\frac{x+2y}{(x^2+xy+y^2)^2}$ pro $(x,y)\neq(0,0)$; v bodě $(0,0)$ jsou obě parciální derivace nulové. **19.** Pokud $x,y>0$ nebo $x,y<0$, pak $\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{z}{y}\cdot\left(\frac{x}{y}\right)^{z-1}$; $\frac{\partial f}{\partial y}=-\frac{zx}{y^2}\cdot\left(\frac{x}{y}\right)^{z-1}$; $\frac{\partial f}{\partial z}=\left(\frac{x}{y}\right)^z\cdot\log\frac{x}{y}$. **20.** Pokud $x>0$ a $y\neq 0$, pak $\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{y}{z}\cdot x^{\frac{y}{z}-1}$; $\frac{\partial f}{\partial y}=x^{\frac{y}{z}}\cdot\log x\cdot\frac{1}{z}$; $\frac{\partial f}{\partial z}=-x^{\frac{y}{z}}\cdot\log x\cdot\frac{y}{z^2}$. **21.** Pokud $x,y>0$, pak $\frac{\partial f}{\partial x}=y^z\cdot x^{y^z-1}$; $\frac{\partial f}{\partial y}=x^{y^z}\cdot\log x\cdot zy^{z-1}$; $\frac{\partial f}{\partial z}=x^{y^z}\cdot\log x\cdot y^z\cdot\log y$.