

XVI.3 Metoda variace konstant

Uvažujme rovnici

$$(*) \quad y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = f(t),$$

kde $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbf{R}$ a f je funkce spojitá na daném intervalu (a, b) .

Definice. Nechť funkce y_1, \dots, y_n tvoří fundamentální systém řešení homogenní rovnice. Pak matici (či přesněji maticovou funkci)

$$\mathbb{U}(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) & y_2(t) & \dots & y_n(t) \\ y'_1(t) & y'_2(t) & \dots & y'_n(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(t) & y_2^{(n-1)}(t) & \dots & y_n^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}$$

nazýváme **fundamentální maticí** homogenní rovnice.

Větička 6. Nechť $\mathbb{U}(t)$ je fundamentální maticí homogenní rovnice. Pak matice $\mathbb{U}(t)$ je regulární pro každé $t \in \mathbf{R}$.

Věta 7 (variace konstant). Nechť funkce y_1, \dots, y_n tvoří fundamentální systém řešení homogenní rovnice. Pokud funkce c_1, \dots, c_n splňují soustavu rovnic

$$c'_1 y_1 + \dots + c'_n y_n = 0,$$

\vdots

$$c'_1 y_1^{(n-2)} + \dots + c'_n y_n^{(n-2)} = 0,$$

$$c'_1 y_1^{(n-1)} + \dots + c'_n y_n^{(n-1)} = f$$

na intervalu (a, b) , pak funkce $y(t) = c_1(t)y_1(t) + \dots + c_n(t)y_n(t)$, $t \in (a, b)$ je řešením rovnice $(*)$.